

## Reihen

### Taylorreihen

- Idee: Wir wollen eine Funktion  $f = f(x)$  in der Umgebung von  $x = x_0$  durch möglichst einfache Funktionen annähern.

Wir verwenden eine konstante Funktion, eine Gerade, eine Parabel u.s.w., die mit der Funktion  $f$  an der Stelle  $x_0$  im Funktionswert, der Steigung, der Krümmung u.s.w. übereinstimmen, also in der nullten, ersten, zweiten u.s.w. Ableitung. Voraussetzung ist natürlich, daß  $f$  entsprechend oft differenzierbar ist.

	Übereinstimmung mit $f$ in		
	Funktionswert $f(x_0)$	Steigung $f'(x_0)$	Krümmung $f''(x_0)$
Konstante	ja	—	—
Gerade	ja	ja	—
Parabel	ja	ja	ja

- Anmerkung: Wir betrachten zunächst den Spezialfall  $x_0 = 0$ .
- Beispiel: Die Funktion  $f(x) = e^x$  wird an der Stelle  $x = 0$  durch eine Konstante, eine Gerade und eine Parabel angenähert.
- Satz

Die Funktion  $f = f(x)$  sei  $k$ -mal differenzierbar an der Stelle  $x = 0$ . Stimmt ein Polynom  $k$ -ten Grades  $\sum_{n=0}^k a_n x^n$  an der Stelle  $x = 0$  bis zur  $k$ -ten Ableitung mit  $f$  überein, dann gilt für die Koeffizienten

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} .$$

- Beweis
- Definition

Die Funktion  $f = f(x)$  sei  $k$ -mal differenzierbar an der Stelle  $x = 0$ . Dann heißt

$$\sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

das **Taylorpolynom**  $k$ -ten Grades von  $f$  mit Entwicklungspunkt  $x = 0$ .

- Beispiele

- Anmerkung: Nun ist die Frage naheliegend, ob bei einer unendlich oft differenzierbaren Funktion  $f$  durch den Übergang von der endlichen Summe zur unendlichen Reihe ein sinnvoller Ausdruck entsteht, d.h. ob die Reihe konvergiert, und ob sie die Funktion  $f$  als Grenzfunktion hat.

Dies ist tatsächlich bei vielen Funktionen der Fall. Die betreffenden Reihen werden als **Taylorreihen** bezeichnet. Der Konvergenzbereich ist stets ein Intervall, in dessen Innerem der Entwicklungspunkt liegt; in manchen Fällen hat man Konvergenz auf der gesamten reellen Achse.

Für Taylorreihen mit dem Entwicklungspunkt  $x = 0$  gilt auf dem Konvergenzintervall

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Man kann allgemeiner Taylorpolynome bzw. -reihen mit einem beliebigen Entwicklungspunkt betrachten und erhält entsprechend auf dem Konvergenzintervall die Formel

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

der Taylorreihe mit Entwicklungspunkt  $x = x_0$ .

- Beispiele: Auf der gesamten reellen Achse konvergent sind die folgenden Taylorreihen der  $e$ -Funktion, der Cosinus- und der Sinusfunktion.

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

- Anmerkung: Die Reihenentwicklungen von  $e^x$ ,  $\cos x$  und  $\sin x$  liefern eine Begründung für die Eulersche Formel

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

die wir bei den komplexen Zahlen kennengelernt haben.

- Beispiel für eine Taylorreihe mit Entwicklungspunkt  $x_0 \neq 0$  und einem Konvergenzbereich ungleich der reellen Achse.
- Anmerkung: Die Grenzfunktion einer Taylorreihe ist auf dem gesamten Konvergenzintervall beliebig oft differenzierbar; die Ableitungen kann man durch gliedweises Differenzieren bekommen.